

お名前： \_\_\_\_\_ 様

検査日： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ( \_\_\_\_\_ ) 予約時間： \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

心電図検査負荷心電図ホルター心電図トレッドミル検査脳波検査簡易睡眠時無呼吸検査

※ 予約時間の 15 分前までに 1 階総合受付に予約票と保険証・紹介状を出してください。

### 心電図検査

標準検査時間

おおよそ 5 分

心臓の動きを電氣的な波形として記録し、それによって心臓の状態を把握する検査です。特に、心臓の活動の異常によってあらわれる不整脈の診断には不可欠な検査です。

### 負荷心電図検査

標準検査時間

おおよそ 15 分

狭心症などの虚血性心疾患や不整脈が疑われた時に行なう検査です。運動で心臓に負荷をかけ、これに伴う心電図の変化を経時的に記録します。

### ホルター心電図検査

標準検査時間（装着・説明の時間）おおよそ 20 分

24 時間の心電図を端末に記録して、不整脈や狭心症の有無を調べます。

日常生活で不整脈や心筋虚血が起きるかどうかがわかります。

又、翌日に装置を外す為、再度ご来院いただきます。

通常型（入浴不可）と防水型（入浴可）の 2 種類あります。

## トレッドミル検査 標準検査時間 おおよそ 30分

胸に電極を付けたまま、ベルトコンベア状の検査装置の上を歩きながら心電図を記録します。

ベルトコンベアの色度と角度の調節により心臓にさまざまな負荷をかけ、これに伴う心電図の変化を記録します。

## 脳波検査 標準検査時間 おおよそ 60分

脳は非常に微弱な電流を流し続けており、その電流を頭部に取り付けた電極より検出し、波形として記録します。

てんかん、部分的機能の低下などが疑われるときに行なわれます。

## 簡易睡眠時無呼吸検査

標準検査時間（装着・説明の時間）おおよそ 15分

自宅でも取扱い可能な検査機器を使い、普段と同じように寝ている間にできる検査です。

手の指や鼻にセンサーをつけ、いびきや呼吸の状態から睡眠時無呼吸症候群（SAS）の可能性を調べます。

又、翌日に装置を外す為、再度ご来院いただきます。

### 川崎駅（JR・京急）から

JR東口7番バス乗り場から「大師」行  
（川23系統）乗車

→「桜本」下車

京急大師線川崎大師駅バス乗り場から

「川崎駅」行（川23系統）乗車

→「桜本」下車

### <お問い合わせ>

川崎協同病院 地域連携室

044-266-2119（直通）

044-299-4781（代表）

