

乳癌： パージェタ・トラスツズマブ療法

★2021.2～ ハーセプチン⇒トラスツズマブへ採用切替

1クール： 21日

◎初回

	薬剤	投与方法	投与時間	Day1	・・・	Day21
①	生理食塩液 250mL	点滴	ルート確保用	↓		
②	パージェタ注 840mg 生理食塩液 250mL	点滴	60分	↓		
③	トラスツズマブ注 8mg/kg 生理食塩液 250mL	点滴	90分	↓		

◎2回目以降

	薬剤	投与方法	投与時間	Day1	・・・	Day21
①	生理食塩液 250mL	点滴	ルート確保用	↓		
②	パージェタ注 420mg 生理食塩液 250mL	点滴	60分※ ¹	↓		
③	トラスツズマブ注 6mg/kg 生理食塩液 250mL	点滴	60分※ ²	↓		

※1 パージェタ投与速度について

初回は60分かけて投与。

初回投与で問題がなければ、2回目以降は30分で投与。

※2 トラスツズマブ投与速度について

初回は90分かけて投与。

初回投与で問題がなければ、2回目は60分で投与。

2回目の投与で問題なければ、3回目以降30分で投与可。

《投与量について》

パージェタ

前回投与から6週間後の翌日以降に投与する場合は初回量を投与。

前回投与から6週間以内に投与する場合は維持量を投与。

トラスツズマブ

前回投与から6週間後の翌日以降に投与する場合は初回量を投与。

前回投与から6週間以内に投与する場合は維持量を投与。

（4週間+1日以上経過しても初回量にはせず、パージェタに合わせる）