

乳がん：パクリタキセル療法 $90\text{mg}/\text{m}^2$ (アバスチンと併用)

★パクリタキセル単独 $80\text{mg}/\text{m}^2$ (アバスチンと併用しない)レジメンもあります。

1クール：28日

| | 薬剤 | 投与方法 | 投与時間 | Day1 | ... | Day8 | ... | Day15 | ... | Day28 |
|--------------------|--|------|-----------|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|
| ① | 生理食塩液 250mL | 点滴 | ルート確保・洗淨用 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| ② | デキサート注 6.6mg 生理食塩液 50mL | 点滴 | 約5分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| ③ | ファモチジン注 20mg ポララミン注 10mg (5mg/管×2) | 管注 | - | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |
| ①の生理食塩液を30分投与後、④開始 | | | | | | | | | | |
| ④ | パクリタキセル注 $90\text{mg}/\text{m}^2$ 生理食塩液 250mL | 点滴 | 60分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | |

★パクリタキセル療法($90\text{mg}/\text{m}^2$)は原則としてアバスチンと併用します。
副作用等でパクリタキセル療法のみで治療することがあります。