

尿路上皮がん：GC療法(3週サイクル)

1クール：21日

	薬剤	投与方法	投与時間	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	...	Day8	...	Day21
①	生理食塩液 500mL ※Day8は生理食塩液 250mL	点滴	ルート確保・水分負荷・ ルート洗浄用	↓						↓		
②	デキサート注 6.6mg 生理食塩液 50mL	点滴	約5分	↓						↓		
③	ゲムシタビン注 【1,000mg/m ² 】 生理食塩液 250mL	点滴	30分	↓						↓		
④	KN3号輸液 500mL	点滴	2時間	↓								
⑤	ラクテック注 500mL	点滴	2時間	↓								
⑥	ラクテック注 500mL	点滴	2時間		↓							
⑦	KN3号輸液 500mL	点滴	2時間		↓							
⑧	ラクテック注 500mL	点滴	2時間		↓							
⑨	フロセミド注 20mg	管注	(⑧の側管より投与)		↓							
⑩	アロキシ注 0.75mg デキサート注 6.6mg 生理食塩液 50mL	点滴	15分		↓							
⑪	生理食塩液 500mL	点滴	2時間(⑩と同時に投与)		↓							
⑫	シスプラチン注 【70mg/m ² 】 生理食塩液 (全量を500mLとする)	点滴	2時間(⑪と同時に投与)		↓							
⑬	ラクテック注 500mL	点滴	2時間		↓							
⑭	フロセミド注 20mg	管注	(⑬の側管より投与)		↓							
⑮	KN3号輸液 500mL	点滴	2時間		↓							
⑯	ラクテック注 500mL	点滴	2時間		↓							
⑰	ラクテック注 500mL デキサート注 6.6mg	点滴	4時間			↓	↓	↓				
⑱	KN3号輸液 500mL	点滴	4時間			↓	↓	↓				