



第26回ももはな会



🌸 日時：2024年2月17日（土）14：00～15：10

🌸 講演・演者：

- ① 「ホルモン感受性陽性 HER2 陰性乳がんに対する治療のアップデートと
抗がん剤による色素沈着」

椎名伸充先生（井上記念病院/乳腺外科部長）

- ② 「アピランスケアをアップデート」

小井塚様（メディカルメイクアソシエーションエーション）

以下、講演内容を抜粋してご紹介致します

最近新しく保険適用となった検査・治療法

＜初期治療＞

ホルモン感受性陽性HER2陰性

- ・ オンコタイプDX
- ・ 術後TS-1®療法
- ・ 術後ページニオ®療法

トリプルネガティブ乳癌

術後キイトルーダ®療法

BRCA遺伝子変異陽性

術後リムバーザ®療法

＜転移・再発治療＞

ホルモン感受性陽性HER2陰性

エンハーツ®療法（HER2低発現にも適応拡大）

最近新しく保険適用に
なった検査・治療
法です。

オンコタイプDX

ホルモン感受性陽性、HER2陰性の乳がん患者（リンパ節転移0-3個まで）を対象。
高スコアでは抗がん剤の上乗せ効果が明らかとなった一方で、中低スコアでは抗がん剤
の上乗せ効果が認められなかった。



80%

20%

Exact science 社HP




抗がん剤治療を選択するた
めに有用のため、
2023年に保険適用に
なりました。

術後TS-1®療法


- 適応
 - ①Stage I～ⅢBのER陽性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌術後患者
 - ②リンパ節転移陽性もしくは陰性で以下に該当する患者
- 方法 1日2回内服を14日連続内服7日休業 1年間

腋窩リンパ節転移 又は 明らかな新血管浸襲	組織学的 グレード	浸潤径		
		2cm未満	2cm以上 3cm未満	3cm以上
なし	グレード1	×	△	○
	グレード2	△	○	○
	グレード3	○	○	○
あり	○：組織学的グレード、浸潤径に係わらず適格			

○：適格、×：不適格、△：増殖マーカーが陽性である症例は適格
「TS-1適正使用ガイドライン」より



術後TS-1®療法の効果 (POTENT試験)



TS-1適正使用ガイドより



TS-1®を追加した群は浸潤疾患のない生存率が5年で5.3%高かった。

術後の治療として
「TS-1」
「ベージニオ」
が登場して
再発率の改善が
期待されるんですね！




術後ベージニオ®療法

- 適応
 - ①HER2受容体(+)HER2(-)乳癌の術後
 - ②リンパ節転移4個以上もしくはリンパ節転移1-3個で腫瘍径5cm以上または組織グレードⅢ
- 方法 毎日1回1錠 1日2回内服 2年間



術後ベージニオ®療法の効果 (monarch E試験)



Journal of Clinical Oncology 2024

ベージニオ®を追加した群は浸潤疾患のない生存率が5年で7.6%高かった。

井上記念病院乳腺外科外来受診中の
患者様にご協力頂き実施しました


色素沈着についての調査

- ・ S-1内服中の14人
- ・ 年齢中央値 54歳
- ・ 観察期間中央値 7.5ヶ月
- ・ 色素沈着の発現 12人 (86%)

何か予防しましたか？




いつから色素沈着が出現しましたか？




色素沈着についての調査

色素沈着のあった身体の部位



色素沈着の範囲




TS-1 内服による
と思われる色素沈着は全体の
86%、2ヶ月目
から主に顔に出現
したんですね。出
現範囲は10%以
下だったので、対
処しなかった方が
多かったんですね




色素沈着についての調査

社会活動に影響が出ましたか



色素沈着に何か対処しましたか



メディカルメイクアップは皮膚変色や皮膚障害などをきれいに隠し、気になる見た目を自然に見せていくものです。



メディカルメイクアップでは この様な症状をきれいに隠します

1. 皮膚の変色症状

抗がん剤投与による色素沈着、血管腫(赤)、色素性母斑(黒、茶)、太田母斑(青)、白斑(白)、刺青(タトゥー)、肝斑、黒皮症 など

2. 皮膚の瘢痕、傷あとの変色

火傷痕、外傷、植皮痕、口蓋裂の手術痕 など


3. 光線(紫外線など)過敏症

膠原病(円板状エリテマトーデス等)、先天性光線過敏症(色素性乾皮症等) 日光蕁麻疹、ポルフィリン症、日焼け止め(アウトドア・登山・ゴルフなど)

太田母斑



メディカルメイクアップ前



メディカルメイクアップ後

抗がん剤の影響による色素沈着



メディカルメイクアップ前



メディカルメイクアップ後

| FreeDial |

0120-122042

特定非営利活動法人 メディカルメイクアップアソシエーション(MMA)

<http://www.medical-makeup.net>



ももはな会の講師を2回も引き受けて下さったメディカルメイクアソシエーションの
小井塚様、事務局の皆様、心のこもった実演をありがとうございました。
ももはな会事務局一同、心より感謝いたします。

2024/3/27

ももはな会事務局